

Termo de Consentimento Informado

Testes do Hidrogênio no Ar Expirado

Os testes do hidrogênio no ar expirado (THE) realizados na Fundação Riograndense Universitária de Gastroenterologia (FUGAST) têm utilidade para detecção de intolerância à lactose, frutose e para pesquisa de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A ingestão de lactose e frutose, durante o teste, pode causar os mesmos sintomas e sinais que o paciente apresenta na vida diária quando ingere leite ou seus derivados e alimentos contendo frutose, como frutas, mel, sucos, etc., por exemplo: diarreia, eliminação de gases, arrotos, ruídos abdominais, dor e distensão abdominal, enjoos. A ingestão de lactulose, que é usada para o teste de supercrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO – sigla em inglês), raramente causa sintomas ou sinais dado o baixo volume utilizado para o exame (10 gramas); quando ocorrem, podem ser: eliminação de gases, dor e distensão abdominal, ruídos abdominais, diarreia, enjoos. Muito raramente, a lactulose pode causar alergia (urticárias). Não existem relatos de reações graves, como reação anafilática (falta de ar por broncoespasmo). Por precaução, relate ao (à) entrevistador (a) qualquer reação adversa que possa já ter apresentado a alimentos, medicamentos ou não, para que possamos tomar as medidas de segurança necessárias. Se for preciso, por questões técnicas ou de contraindicação ao uso da lactulose, será administrado glicose, se não houver algum impedimento médico. Em todos os testes, alguns pacientes podem sentir discreta tontura e, às vezes, leve dor de cabeça.

Eu, _____ declaro estar ciente do presente Termo de Consentimento Informado, esclarecidas todas as dúvidas a respeito e de acordo para submeter-me ao Teste do Hidrogênio no Ar Expirado com substrato _____

Porto Alegre, RS, _____ de _____ de 20 _____

CPF: _____

Assinatura do paciente ou responsável: _____