

PREPARO PARA O EXAME DE PHMETRIA E MANOMETRIA ESOFÁGICA

ORIENTAÇÕES PREPARO PARA O DIA ANTERIOR AO EXAME:

1. NÃO INGERIR café, açaí, Coca-Cola, alimentos e bebidas que contenham corante.
2. Se for fumante ou faz uso de bebida alcoólica, é necessário ficar 24H antes do exame SEM FAZER USO destas substâncias.
3. Paciente que tenha Doença de Chagas fazer dieta líquida neste dia.
4. O paciente deverá estar sem tomar qualquer medicamento para o estômago. Os medicamentos que devem ser SUSPENSOS são:

No mínimo 7 dias antes do exame: Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol (Tecta / Inilok), Rabeprazol (Pariet), Esomeprazol (Nexium), Dexlansoprazol (Dexilant), Cimetidina, Ranitidina, Famotidina, Pyloripac, Omepramix, Helicopac.

No mínimo 3 dias antes do exame: Metroclopramida (Plasil), Bromoprida (Digesan), Domperidona (Motilium, Peridal).

No mínimo 2 dias antes do exame: Antiácidos em geral: Lufta Gastro Pro, Simeco Plus, Maalox Plus, Sucrafilm, etc.

5. Exame de PHMETRIA sugerimos fazer o asseio corporal (tomar banho) antes do exame, pois durante as 24 horas seguintes não poderá fazê-lo, sob o risco de danificar o aparelho e perder o exame.

NO DIA DO EXAME

1. ESTAR EM JEJUM DE 08 HORAS (inclui alimentos líquidos).
2. Trazer no dia os exames relacionados ao esôfago como (endoscopia digestiva alta, radiografia de esôfago, manometria e phmetria esofágicas, Laringoscopia, Videodeglutograma).
3. Trazer pedido médico, documento de identidade com foto e carteira do convênio se possuir.
4. Paciente poderá trabalhar desde que não execute tarefas com esforço físico ou movimentação intensa.
5. Não deverá dirigir automóvel ou similar.
6. Paciente que realizou PHMETRIA não deverá se expor a chuva.
7. No dia do exame comparecer com camisa aberta na frente para facilitar a fixação do eletrodo.
8. Traje proibido para realização do exame: macacão e vestidos.
9. Durante a PHMETRIA o paciente poderá se alimentar normalmente com exceção de bebidas com gás (água com gás, refrigerantes, cerveja ou espumantes).
10. Estes exames não devem ser realizados no mesmo dia que a Endoscopia pois os sedativos e os preparos destes exames interferem no resultado.